Biocondil + NC2 PACK

70134435 4DUO/N-14

FR CARTILAGE*

Biocondil + NC2 PACK est l'association de deux compléments alimentaires :

- **Biocondil**, comprimés pelliculés. 1 comprimé contient 750 mg de D-glucosamine HCl (625 mg de glucosamine), 600 mg de chondroïtine sulfate et 20 mg vitamine C (25% AR).
- **NC2** gélules. 1 gélule de **NC2** contient 40 mg de cartilage standardisé dont 10 mg de collagène total (incluant le collagène de type II natif (non dénaturé)) ainsi que 12 mg de vitamine C (15% AR).

Le cartilage est un tissu conjonctif spécialisé formé par des chondrocytes au sein d'une matrice extracellulaire constituée de glycosaminoglycanes et de collagène.

Le squelette contient trois grands types de cartilage :

1. Le cartilage hyalin lui-même divisé en 2 catégories
   - le cartilage articulaire : il est présent à la jonction de deux os à la surface des articulations mobiles comme le genou. Aidé par le liquide synovial, le cartilage articulaire empêche le frottement des surfaces osseuses. Il doit être à la fois suffisamment rigide tout en restant déformable afin de permettre une répartition homogène des pressions qui s'exercent sur l'articulation.
   - le cartilage non articulaire : il est présent dans la cloison nasale, les anneaux des bronches et de la trachée, l'extrémité des côtes, etc.
2. le cartilage fibreux est un tissu intermédiaire entre le cartilage et le tissu conjonctif fibreux.
3. le cartilage élastique est, quant à lui, retrouvé au niveau de l'oreille externe, de l'épiglotte, etc.

Pour favoriser le confort articulaire, la mobilité, ainsi que la capacité à mener différentes activités quotidiennes, il est important de conserver une bonne qualité et un fonctionnement normal du cartilage.

La glucosamine (Biocondil)
Le chlorhydrate de glucosamine est un produit très pur (> 99%) et très stable. Le chlorhydrate de glucosamine ne contient pas de sel ajouté (NaCl ou KCl) et présente l'avantage d'avoir une haute teneur en glucosamine.

La chondroïtine (Biocondil)
La chondroïtine appartient à la famille des glycosaminoglycanes. Elle est généralement utilisée en association avec le chlorhydrate de glucosamine.

Le collagène de type II natif - non dénaturé (NC2)
Le collagène de type II est obtenu grâce à un procédé unique à basse température breveté qui en garantit la qualité. Ce type de fabrication permet d'obtenir un collagène de type II ayant conservé sa structure originale : la forme de triple hélice ayant gardé ses épitopes.

La vitamine C (Biocondil + NC2)
* La vitamine C contribue à la formation normale du collagène pour la fonction normale des cartilages.
Elle intervient dans de nombreuses autres fonctions.

BIOCONDIL + NC2 : UNE COMBINAISON IDÉALE.
UTILISATION
Administration orale.
Prise journalière:

- 2 comprimés de **Biocondil** à prendre en une fois avec un verre d'eau, de préférence pendant le repas principal.
- 1 gélule de **NC2** à jeun, avec un verre d'eau.

PRÉSENTATION
Boîte de 180 comprimés pelliculés de **Biocondil** et 90 gélules de **NC2**.

INGREDIENTS
Par 2 comprimés de Biocondil :
Chlorhydrate de D-glucosamine **(crustacés)** : 1500 mg (1250 mg de glucosamine). Sulfate de chondroïtine : 1200 mg. Agents de charge: cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, povidone. Vitamine C : 40 mg (L-ascorbate de sodium, 50% AR). Agents d'enrobage : alcool polyvinylique, dioxyde de titane (colorant), polyéthylène glycol, talc. Antiagglomérants : stéarate de magnésium, silice colloïdale.

Par gélule de NC2 :
Agents de charge : amidon de maïs, amidon prégélatinisé. Gélule : gélatine. 40 mg de cartilage standardisé contenant 10 mg de collagène total (incluant le collagène de type II natif (non dénaturé)), 12 mg de vitamine C (L-ascorbate de sodium, 15% AR). Antiagglomérant: silice colloïdale. Colorant de la gélule : dioxyde de titane.
** Apport de référence

PRÉCAUTIONS
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Ne se substitue pas à un régime alimentaire équilibré et varié ainsi qu'à un mode de vie sain.

CONSERVATION
Tenir hors de portée des enfants. A conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.
Validité: voir date de péremption sur l'emballage.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
NUMÉRO DE NOTIFICATION
BIOCONDIL COMPRIMÉS : NUT/AS 21/22
NC2 GÉLULES : NUT/AS 21/27

FABRICANT
S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • Belgique

NL KRAAKBEEN*

Biocondil + NC2 PACK is de associatie van twee voedingssupplementen in éénzelfde verpakking:

- **Biocondil** filmtabletten bevatten 750 mg D-glucosamine HCl (625 mg glucosamine), 600 mg chondroïtinesulfaat, 20 mg vitamine C (25% RI) per tablet.
- **NC2** capsules bevatten 40 mg gestandaardiseerd kraakbeen bevattende 10 mg totaal collageen (waarvan natief collageen type II (niet gedenatureerd)) en 12 mg vitamine C (15% RI).

Kraakbeen is een speciale vorm van bindweefsel. Het is samengesteld uit chondrocyten die zijn vervat in een extracellulaire matrix bestaande uit glycosaminoglycanen en collageen.

Het skelet bevat drie grote soorten kraakbeen:

1. Het hyalien kraakbeen dat op zijn beurt wordt onderverdeeld in 2 categorieën:
   - articulair kraakbeen: dit zit in de verbinding van twee beenderen aan het oppervlak van mobiele gewrichten zoals de knie. Geholpen door het synoviaal vocht voorkomt het articulair kraakbeen dat de botoppervlakken tegen elkaar wrijven. Het moet voldoende stijf zijn, maar tegelijk ook vervormbaar blijven om de druk op het gewricht homogeen te kunnen verdelen.
   - niet-articulair kraakbeen: dit zit in de neuswand, de ringen van de bronchiën en de luchtpijp, de uiteinden van de ribben, enz.
2. Het fibreus kraakbeen is weefsel tussen het kraakbeen en het fibreus bindweefsel.
3. Het elastisch kraakbeen vinden we terug in het uitwendig oor, de strotklep, enz.

Om het gewrichtscomfort, de mobiliteit en het vermogen om verschillende dagelijkse activiteiten uit te voeren te bevorderen, is het belangrijk dat het kraakbeen van goede kwaliteit blijft en goed blijft functioneren.

Glucosamine (Biocondil)
D-glucosaminehydrochloride is een zeer zuiver (>99%) en zeer stabiel product. D-glucosaminehydrochloride bevat geen zout (NaCl of KCl) en heeft het voordeel van een hoog gehalte aan glucosamine te bevatten.

Chondroïtine (Biocondil)
Chondroïtïne behoort tot de familie van de glycosaminoglycanen. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met het glucosaminehydrochloride.

Natief type II collageen (NC2)
Het type II collageen wordt bereikt door middel van een uniek gepatenteerd proces op lage temperatuur die de kwaliteit garandeert. Dankzij dit uniek productieproces behoudt het type II collageen zijn oorspronkelijke structuur: de vorm van een drievoudige helix waarbij de epitopen bewaard zijn gebleven.

Biocondil+NC2-Pack-N-14.indd 1 22/05/18 16:37

Biocondil + NC2 PACK

7013443540UO/N-14

Vitamine C (Biocondil + NC2)
* Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van kraakbeen.

Het is betrokken bij vele functies.

BIOCONDIL + NC2: DE IDEALE COMBINATIE.

GEBRUIK
Orale toediening.
Dagelijkse inname:
- 2 **Biocondil** tabletten in één inname met een glas water. Het wordt aangeraden om **Biocondil** in te nemen tijdens de hoofdmaaltijd.
- 1 capsule **NC2**, op een nuchtere maag, met een glas water.

VOORSTELLING
Verpakking van 180 filmtabletten **Biocondil** en 90 capsules **NC2**.

BESTANDDELEN
Per 2 tabletten Biocondil:
D-glucosaminehydrochloride **(schaaldieren):** 1500 mg (1250 mg glucosamine). Chondroïtinesulfaat: 1200 mg. Vulmiddelen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, povidone. vitamine C: 40 mg (L-natriumascorbaat, 50% RI). Glansmiddelen: polyvinylalcohol, titaniumdioxide (kleurstof), polyethyleenglycol, talk. Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide.
Per capsule* NC2*:
Ingrediënten per capsule: Vulmiddelen: maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel. Capsule: gelatine. 40 mg gestandaardiseerd kraakbeen bevattende 10 mg totaal collageen (waarvan natief collageen type II (niet gedenatureerd)), 12 mg vitamine C (L-natriumascorbaat, 15% RI). Antiklontermiddel: colloïdaal siliciumdioxide. Kleurstof van de capsule: titaniumdioxide.
** Referentie inname

VOORZORGSMAATREGELEN
De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Vervangt nooit een afwisselende en evenwichtige voeding noch een gezonde levensstijl.

BEWARING
Buiten bereik van kinderen houden. In zijn oorspronkelijke verpakking en op een koele en droge plaats bewaren.
Houdbaarheid: zie vervaldatum op de verpakking.

VOEDINGSSUPPLEMENT
NOTIFICATIENUMMER
BIOCONDIL TABLETTEN : NUT/AS 21/22
NC2 CAPSULES : NUT/AS 21/27

FABRIKANT
N.V FarmaceutischeLaboratoria Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • België

EN CARTILAGE*

Biocondil + NC2 PACK is the combination of two food supplements in only one packaging:
- **Biocondil**, film-coated tablets containing 750 mg D-glucosamine hydrochloride (625 mg glucosamine), 600 mg chondroitin sulphate and 20 mg vitamin C (25% RI) per tablet
- **NC2** capsules containing 40 mg standardized cartilage containing 10 mg of total collagen (including native type II collagen (undenatured)) and 12 mg vitamin C (15% RI)

Cartilage is a specialised connective tissue formed by chondrocytes within an extracellular matrix made of glycosaminoglycans and collagen.

The skeleton contains three main types of cartilage:
1. Hyaline cartilage is itself divided into 2 categories
   - Articular cartilage: this is present at the junction of two bones, on the surface of moving joints such as the knee. The articular cartilage, with the help of the synovial fluid, prevents bony surfaces from rubbing together. It must be sufficiently rigid, while at the same time remaining flexible in order to evenly distribute pressure over the joint.
   - Non-articular cartilage: this is present in the nasal septum, the rings of the bronchi and trachea, the ends of the ribs, etc.
2. Fibrocartilage is an intermediary tissue between the cartilage and fibrous connective tissue.
3. As for elastic cartilage, this is found at the outer ear, the epiglottis, etc.

For improved joint comfort, mobility, and the resulting ability to carry out various daily activities, it is important to preserve high cartilage quality (and function).

Glucosamine (Biocondil)
D-glucosamine hydrochloride is a very pure (>99%) and very stable product. D-glucosamine hydrochloride does not contain any salt (NaCl or KCl) and has the advantage of having a high content of glucosamine.

Chondroitin (Biocondil)
Chondroitin belongs to the family of glycosaminoglycans. It is usually used in combination with glucosamine hydrochloride.

Native type II collagen (NC2)
The type II collagen is achieved through a unique patented process at low temperature which ensures quality. This type of process allows type II collagen retaining its original structure: the form of a triple helix having kept its epitopes.

Vitamin C (Biocondil + NC2)
* Vitamin C contributes to to normal collagen formation for the normal function of cartilage.

It is involved in many other functions.

BIOCONDIL + NC2: THE IDEAL COMBINATION.

USE
Oral use.
Daily intake:
- 2 tablets **Biocondil** to be taken at once with a glass of water, preferably during the main meal
- 1 capsule **NC2** on an empty stomach with a glass of water.

PRESENTATION
Box of 180 film-coated tablets **Biocondil** and 90 capsules **NC2**.

INGREDIENTS
Per 2 tablets Biocondil:
D-glucosamine hydrochloride **(crustaceans)**: 1500 mg (1250 mg glucosamine). Chondroitin sulphate: 1200 mg. Filling agents: microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose, povidone. vitamin C: 40 mg (sodium L-ascorbate, 50% RI). Coating agents: polyvinyl alcohol, titanium dioxide (colouring agent), polyethylene glycol, talc. Anti-caking agents: magnesium stearate, colloidal silica.
Per capsule NC2:
Filling agents: corn starch, pregelatinised starch. Capsule: gelatin. 40 mg standardized cartilage containing 10 mg of total collagen (including native type II collagen (undenatured)), 12 mg vitamin C (sodium L-ascorbate, 15% RI). Anti-caking agent: colloidal silica. Colouring agent of the capsule: titanium dioxide.
** Reference intake

PRECAUTIONS
Do not exceed the recommended daily intake. A food supplement does not substitute a varied and balanced diet, nor a healthy lifestyle.

STORAGE
Keep out of reach of children. Store in his packaging of origin in a dry and ventilated place.
Validity: see expiration date on the packaging.

FOOD SUPPLEMENT
NOTIFICATION NUMBER
BIOCONDIL TABLETS: NUT/AS 21/22
NC2 CAPSULES: NUT/AS 21/27

MANUFACTURER
S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • Belgium

TRENKER

Biocondil+NC2-Pack-N-14.indd 2 22/05/18 16:37